



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Aydınlatılmış Onam Formu

Hidroksiklorokin (Plaquem!, Quensyl)

Kategori: ilaç - Romatoloji - Temel etkili anti-romatizmal

ilaçlar

Tanım:

Doktorunuz sizinle tedavinizde hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımının gereklili i hakkında konu tu. Hidroksiklorokin anti-protozoal bir ilaçtır ve sıtma tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda temel etkili anti-romatizmal bir ilaçtır. Eklemlerde olan inflamasyon, i lik, tutukluk ve a rı ikayetlerinin tedavisinde etkilidir. Hidroksiklorokin ayrıca lupus (SLE), Sjögren sendromu, romatoid artrit, antifosfolipid sendromu gibi ba dokusu hastalıklarının çe itli bulgularının tedavisinde de kullanılır.

Faydaları:

Çe itli romatolojik hastalıklarda (lupus (SLE), Sjögren sendromu, romatoid artrit gibi) etkili oldu u klinik çalı malar ile kanıtlanmış bir ilaçtır .

Alternatifleri:

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danı arak ö renebilirsiniz.

Riskleri:

- Alerjik reaksiyonlar: nefes darlı ı, bo azda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, i lik veya kurde en (ürtiker) geli irse doktorunuzla irtibata geçiniz.
- Ciltte ka ıntı ve renk de i ikli i. Nadiren sedef hastalı ını tetikleyebilir.
- Ba a rısı, ba dönmesi, sersemlik hissi.
- Saç dökülmesi ve saçlarda renk de i ikli i.
- Karın a rısı, bulantı, kusma, ishal.
- Ruh halinde de i iklikler, sinirlilik, a rı heyecanlanma.
- İlaç etkile imleri: Hidroksiklorokin tedavisine ba lamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkile imlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta oldu unuz tüm ilaçlar ve ilaç dı ı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Kan, karaci er, böbrek hastalı ı veya görme probleminiz var ise, hidroksiklorokin kullanımı adı geçen hastalıkları kötüle tirebilir.
- Hidroksiklorokin kullanımına ba lı olarak bulanık görme veya görme ile ilgili ba ka problemler geli ebilir. lacın kesilmesine ra men bu problemler devam edebilir. lacın kullanımı sırasında görmeniz ile ilgili problemler geli irse doktorunuz ile irtibata geçiniz. Görme ile ilgili bir probleminiz olmasa da en azından 6 ayda bir göz muayenesi olunuz.

- İlacın kullanımına başlamadan önce gebelikte ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin erken dönemde tespit edilebilmesi amacıyla, ilacı kullanmaya başladıktan sonra ilk ay, 2 haftada bir, sonraki 3 ay, ayda bir, ve takip eden aylarda, 2 ayda bir defa tam kan sayımı ve Üre, kreatinin, AST, ALT tetkiklerini yaptırarak sonuçlarını doktorunuza bildiriniz.
- Gebelik E er gebe iseniz doktorunuz ile konu madan ilacı almaya başlamayınız. Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı ilacın doğrudan doğruya bebek üzerine zararlı etkileri olup olmadığının bilinmediğidir. E er gebe iseniz doktorunuza danışmadan ilacı almaya başlamayınız. Ancak ilacın potansiyel faydası olası riskinden fazla ise gebelikte yakın takiple kullanılabilir.
- Emzirme: Hidroksiklorokin anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. E er anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa tedavisi için doktorunuza danışmanız gereklidir.

Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlamadan herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak hidroksiklorokin'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Notlar

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel risklere baskın olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hemşire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı: Adres: Tel:	Hastanın imzası:	Tarih:
Tamim: Hasta yakını veya vasi • 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını • Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ihtiyacı olan • Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman	Anne [] Baba [] Diğeri [] Adı Soyadı: Adres: Tel: imzası:	Tarih:
Doktorun Adı Soyadı: Adres: Tel:	Doktorun imzası:	Tarih:

Kaynaklar:

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Başkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı Çift Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. www.uptodate.com