



# TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

## Aydınlatılmı Onam Formu

### Kortikosteroidler

---

**Kategori:** ilaç - Romatoloji - Anti-inflamatuar

#### **Tanım:**

Doktorunuz sizinle tedavinizde kortikosteroid grubu ilacın kullanımının gereklili i hakkında konu tu. Kortikosteroid steroid anti-inflamatuar ilaçlar grubundan bir ilaç olup, inflamatuvar, immünolojik ve allerjik çok sayıda hastalı ın tedavisinde kullanılabilen bir ilaçtır. A ız yoluyla veya enjeksiyon ekinde kullanılabilir.

#### **Faydaları:**

İltihap ile karakterize çok sayıda hastalı ın tedavisinde etkili bir ilaçtır.

#### **Alternatifleri:**

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danı arak ö renebilirsiniz.

#### **Riskleri:**

- Allerjik reaksiyonlar: Nefes darlı ı, bo azda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, i lik veya kurde en (ürtiker) geli irse doktorunuzla irtibata geçiniz.
- Enjeksiyon yerinde yanma, uyu ma, irritasyon, enfeksiyon, skar dokusu.
- Enfeksiyonlara yatkınlık, göz tansiyonu (glokom), katarakt (göz lensinde opakla ma ve bulanık görme), kemik erimesi (osteoporoz), osteonekroz (avasküler nekroz), yüksek kırık riski, kemik kırıklarında geç iyile me yapabilir.
- Ciltte döküntü, incelme, morarma, renk ve kıvam de i ikli i.
- Tüülenmede artı .
- Görmede ı ı a kar ı artımı duyarlılık.
- Karın a rısı, bulantı, kusma.
- Hızlı kilo alma, açlık ve susuzluk hissinde artı . Santral obezite, i tah artı ı.
- Yüzde ya kitlesinde artı (aydede yüz görünümü), ciltte küçük damarlarda geni leme
- Sık idrara çıkma.
- Duygulanım bozuklukları, yorgunluk hissi, depresyon, halüsinasyonlar.
- Kas güçsüzlü ü, kas kitlesinde azalma ve kas erimesi.
- Yüksek tansiyon (hipertansiyon), su ve tuz tutulumu.Vücutta ya da ılımlında dengesizlik.
- Mevcut diyabet ( eker) hastalı ının kontrolünde bozukluklar.
- Uzun süre kullanılır ve aniden kesilirse; böbrek üstü bezlerinde yetmezlik olu abilir.
- Yumurtlama (ovulasyon) ve adet düzensizlikleri olu abilir. Gençlerde büyüme ve geli me problemleri olabilir.

- İlaç etkileşimleri: Kortikosteroid tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Gebelik: Kortikosteroidler, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğum öncesi dönemde bebeğe doğumsal anomalilere yol açıp açmadığının bilinmediğidir. Eğer gebe iseniz doktorunuz ile konumadan ilacı almaya başlamayınız. Ancak ilacın potansiyel faydası olası riskinden fazla ise gebelikte yakın takiple kullanılabilir.
- Emzirme: Kortikosteroidler anne sütüne geçebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa takdirde tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

## Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

## Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak kortikosteroid'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



**TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE**

## Notlar

---

---

---

---

---

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel risklere bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hemşire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

<b>Hastanın Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Hastanın imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Tanık: Hasta yakını veya vasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını</li><li>• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye elverişli</li><li>• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman</li></ul>	<b>Anne [ ] Baba [ ] Diğeri [ ]</b> <b>Adı Soyadı:</b> <b>Adres:</b> <b>Tel:</b> <b>imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Doktorun Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Doktorun imzası:</b>	<b>Tarih:</b>

**Kaynaklar:**

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Başkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı Nispetiye Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)