



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Aydınlatılmış Onam Formu

Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (Non-Steroid Antienflamatuvar ilaçlar)

Kategori: ilaç - Romatoloji - Anti-enflamatuvar – Anti-romatizmal- Analjezik

Tanım:

Doktorunuz sizinle tedavinizde steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların kullanımının gereklili i hakkında konu tu. Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar; anti-inflamatuvar, anti-romatizmal, analjezik ilaçlar grubunda yer alan, eklem ağrısı ve eklem iltihabı, di er a rılı durumlar dahil çok sayıda hastalı ın tedavisinde (daha çok semptomatik, rahatlatıcı) kullanılabilen ilaçlardır. A ız yoluyla veya enjeksiyon ekinde kullanılabilirler.

Faydaları:

İltihap ve ağrı ile karakterize çok sayıda hastalıkta (osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriatik artrit vb) etkili ilaçlardır.

Alternatifleri:

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Riskleri:

- Alerjik reaksiyonlar: nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen (ürtiker) gelişirse doktorunuzla iletişime geçiniz.
- Enjeksiyon yerinde yanma, uyuşma, irritasyon, enfeksiyon, skar dokusu.
- Mide – barsak sistemi (gastrointestinal sistem) üzerine; mide iç yüzeyini kaplayan mukoza dokusunda damar yapısını etkileyerek, kanama ve hatta gastrite (iltihap), ülsera neden olabilirler. Özellikle bilinen mide ve/veya on iki parmak barsa ı (duodenum) ülserinin varsa doktorunuza bilgi veriniz. Bazı romatizmal hastalıklarda beraberinde kullanılacak steroidlerle bu etki daha da artabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, barsak perforasyonu (delinme, yırtılma), ishal görülebilir.
- Vücutta su ve tuz tutulumuna yol açacağından böbrek hastalığı/yetmezliği, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon probleminiz varsa bu gibi durumlarda steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların kullanımını riskli olabilir.
- Baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, görmede ı ı a kar ı artımı duyarlılık nöbet e i inin dümesine yol açabilirler.
- Kemik ili inde baskılanma, kan hücrelerinin (kırmızı kan, beyaz kan hücreleri, kan pulcukları) sayısında azalma yapabilirler. Karaci er fonksiyon testlerinde bozulma, ilaca bağlı toksik hepatit, pankreatite neden olabilirler.
- Ciltte döküntü, kaşıntı, ilaç erüpsiyonlarına (eritema multiforme gibi), toksik epidermal nekroliz, neden olabilirler.

- Bunların dışında daha az önemli olan ve yaşamı tehdit edici karakterde olmayan diğer etkilere de rastlanabilmektedir: akut renal (böbrek) yetmezlik, agranülositoz (beyaz kan hücrelerinin sayısında belirgin azalma), anjiyoödem, aritmiler, aseptik menenjit, konjestif kalp yetmezliği, dispne, hemolitik anemi, toksik ambliyopi, taşikardi.
- İlaç etkileşimleri: steroid olmayan antiinflamatuar ilaç tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaçları tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Gebelik: steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde C kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğum sırasında bebekte doğumsal anomalilere yol açıp açmadığının bilinmediğidir. Eğer gebe iseniz doktorunuz ile konu madan ilacı almaya başlamayınız. Ancak ilacın potansiyel faydası olası riskinden fazla ise gebelikte yakın takiple kullanılabilir.
- Gerekli durumlarda yakın takip ile gebelikte 32. haftaya kadar bu grupta bazı ilaçlar dikkatle kullanılabilir. Fakat özellikle bu zamandan sonra bebekte damarsal anomali – problemlere (ductus arteriosusun açık kalması gibi) neden olabilirler.
- Emzirme: steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar; anne sütüne geçebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir. Ayrıca bu grupta çok sayıda ilaç olduğundan ve burada genel özellikleri kısaca verildiğinden, bu grupta yer alan ilaçların kendine özgü diğer istenmeyen veya beklenmeyen olası etki/yan etkileri olabilir.

Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak steroid olmayan antiinflamatuar ilaçları kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.

Notlar

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel durumlara bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hemşire ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı: Adres: Tel:	Hastanın imzası:	Tarih:
Tamık: Hasta yakını veya vasi <ul style="list-style-type: none">• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ihtiyacı olan• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman	Anne [] Baba [] Di er [] Adı Soyadı: Adres: Tel: imzası:	Tarih:
Doktorun Adı Soyadı: Adres: Tel:	Doktorun imzası:	Tarih:

Kaynaklar:

1. www.uptodate.com