



TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Aydınlatılmış Onam Formu

Siklofosfamid (Endoxan, Alkyloxan)

Kategori: ilaç - Romatoloji - immünosupresif

Tanım:

Doktorunuz sizinle tedavinizde siklofosfamid adlı ilacın kullanımının gerekliliği hakkında konuştunuz. Siklofosfamid onkolojide tümör tedavisinde kullanılan bir ilaç olmakla birlikte, özellikle vaskülitler, Behçet hastalığı, lupus (SLE), Sjögren, skleroderma, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarda da kullanımı olan bir ilaçtır. Sıklıkla serum içinde damar yolu ile kullanılmakla beraber ağız yolu ile de alınabilen bir ilaçtır.

Faydaları:

Çeşitli otoimmün hastalıkların, özellikle ciddi organ tutulumları olan, hayatı tehdit eden formlarının tedavisinde etkili olduğu klinik çalışmalar ile gösterilmiş bir ilaçtır.

Alternatifleri:

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz.

Riskleri:

- Alerjik reaksiyonlar: nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, şişlik veya kurdeşen (ürtiker) gelişirse doktorunuzla iletişime geçiniz.
- Ağızda metalik tat.
- Kilo kaybı, bulantı, kusma ve ishal.
- Hem kadın hem de erkekte kalıcı infertiliteye (kısırlık) neden olabilir.
- Karaciğer, kemik iliği, böbrek, akciğer ve beyinde hasara neden olabilir.
- Hemorajik sistit (kanlı mesane iltihabı). Uzun süre kullanımında mesane kanseri riski bulunmaktadır.
- Anemi (kansızlık), halsizlik, yorgunluk.
- Trombosit (kan pıhtılaşma hücreleri) sayısında azalma ve kanama riskinde artışı.
- Lökosit (beyaz küre) sayısında azalma ve infeksiyon riskinde artışı.
- Pulmoner fibrozis (Akciğerlerde nedbe dokusu gelişimi ve hasar), nadir olmakla beraber görülebilen bir komplikasyondur.
- İlaç etkileşimleri: Siklofosfamid tedavisine başlamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkileşimlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar ve ilaç dışı tedaviler hakkında bilgi veriniz.
- Gebelik: Siklofosfamid, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde D kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, doğum

bebekte do umsal anomalilere yol açabilece idir. E er gebe iseniz doktorunuz ile konu madan ilacı almaya ba lamayınız.

- Emzirme: Siklofosamid emzirilen bebe e zarar verebilir. E er anne sütü ile çocu unuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşün.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla kar ıla ıldı ı takdirde tedaviyi ba layan hekiminize danışmanız gereklidir.

Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca ba lı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile kar ıla mayaca ımı anlıyorum.

Onamın geri çekilmesi:

lacı almaya ba lamadan önce istedi iniz zaman ilacı kullanmak için vermi oldu unuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak siklofosamid'i kullanmaya ba ladı ınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmi olursunuz. lacın ani olarak bırakılması ya da dozunun de i tirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar do urabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir de i iklik yapmayınız.



TÜRKİYE ROMATOLOJİ DERNEĞİ

Notlar

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel ilaçlara bağımlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem bire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

Hastanın Adı Soyadı: Adres: Tel:	Hastanın imzası:	Tarih:
Tamık: Hasta yakını veya vasi <ul style="list-style-type: none">• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ahitlik eden• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman	Anne [] Baba [] Diğer [] Adı Soyadı: Adres: Tel: imzası:	Tarih:
Doktorun Adı Soyadı: Adres: Tel:	Doktorun imzası:	Tarih:

Kaynaklar:

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Başkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı Çift Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. www.uptodate.com