



# TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

## Aydınlatılmış Onam Formu

### Varfarin (Coumadin)

---

**Kategori:** İlaç - Kardiyovasküler- Antikoagülan

**Tanım:**

Doktorunuz sizinle tedavinizde varfarin adlı ilacın kullanımının gereklili ği hakkında konu tu. Varfarin, kanın pıhtı olu turma ği levini azaltma yolu ile etki eden bir ilaç olup, yeni pıhtı geli mi olan ya da daha önce pıhtı geli mi olan hastalarda pıhtı geli me riskini azaltmak amacıyla kullanılır.

**Faydaları:**

- Varfarin: antifosfolipid sendromu, kateter ta ryan hastalar, yapay kalp kapa ı takılı hastalar, pıhtıla maya e ilimi olan hastalar, kalp ritm problemi olan hastalar ve di er birçok hastalıkta kullanılan bir ilaçtır.

**Alternatifleri:**

Sizin için uygun olabilecek farklı tedavi yöntemlerini doktorunuza danı arak ö renebilirsiniz.

**Riskleri:**

- İshal, gaz, karında ği kinlik hissi, bulantı, kusma.
- Varfarin kanı inceltti ği için, morarma veya kanama (iç organ kanaması dahil) riskini artırır. Bu tür problemler ya arsanız doktorunuzla irtibata geçiniz.
- Alerjik reaksiyonlar: Nefes darlı ı, bo azda tıkanma hissi, dudaklarda, dilde, yüzde, i lik veya kurde en (ürtiker) geli irse doktorunuzla irtibata geçiniz..
- E er bakteriyel endokardit, hipertansiyon, hemofili veya di er kan hastalıkları, mide ülseri, veya karaci er hastalı ı varsa, veya cerrahi i lem planlanıyorsa, doktorunuzu bu durum hakkında uyarmanız gereklidir.
- Kanama riskini artırdıklarından dolayı Varfarin alırken aspirin, ibuprofen, veya di er non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç almayınız.
- Büyük abdest renginin de ği mesi, idrar veya büyük abdestte kan görülmesi.
- Derinizde toplui ne ba ı büyüklü ünde kırmızı noktalar, alı ılmadık kanamalar veya morarmalar geli ebilir. Varfarin hem iç hem de dı kanama e iliminizi arttırabilir. Bu nedenle kanamayı kolayla tırabilecek olan temas sporları, tıra olma, di lerinizi fırçalama ve di er aktiviteler sırasında dikkatli olmanız gerekir.
- İlaç etkile imleri: Varfarin tedavisine ba lamadan önce, ciddi hatta hayatı tehdit edebilecek ilaç etkile imlerinin olmasını engellemek için doktorunuza halen kullanmakta oldu unuz tüm ilaçlar ve ilaç dı ı tedaviler hakkında bilgi veriniz.

- Gebelik: Varfarin, Amerikan Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ilaçların gebelikte kullanımı ile ilgili hazırlanan risk değerlendirme rehberinde X kategorisinde bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. Bunun anlamı, dozu mamı bebekte dozuumsal anomalilere yol açabileceğidir. Eğer gebe iseniz doktorunuz ile konu madan ilacı almaya başlamayınız.
- Emzirme: Varfarin emzirilen bebeğe zarar verebilir. Eğer anne sütü ile çocuğunuzu besliyorsanız ilacı almadan önce doktorunuzla görüşünüz.
- Bu istenmeyen etkiler en sık görülenleri olup, beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa takdirde tedaviyi başlatan hekiminize danışmanız gereklidir.

### Sonuçlar

- Bu ilacı kullanmak için gerekli onayı vermemem durumunda bu ilaca başlı herhangi bir fayda ve ilaçla ilgili herhangi bir risk ile karşılaşmayacağımı anlıyorum.

### Onamın geri çekilmesi:

İlacı almaya başlamadan önce istediğiniz zaman ilacı kullanmak için vermiş olduğunuz onayı geri çekebilirsiniz. Ancak varfarin'i kullanmaya başladığınız andan itibaren bu ilaçtan kaynaklanacak tüm fayda ve riskleri kabul etmiş olursunuz. İlacın ani olarak bırakılması ya da dozunun değiştirilmesi ciddi hatta hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doktorunuzun onayı olmadan ilacınızın dozunda herhangi bir değişiklik yapmayınız.



TÜRK YE ROMATOLOJ DERNE

Notlar

---

---

Sizin hastalığınız ve tıbbi durumunuzdan kaynaklanan özel şartlara bağlı olarak adı geçen ilacın ek fayda ya da riskleri olabilir. Doktorunuz bu özel durumlar hakkında size bilgi verecektir.

Bana doktorum tarafından kullanmam tavsiye edilen yukarıda adı geçen ilaç ile ilgili tüm fayda ve riskleri okudum. Doktor, hem bire, ve / veya diğer görevli bir personel tarafından ilaç ile ilgili tüm sorularıma cevap verildi. Kendi iradem ile bana tavsiye edilen ilacı kullanmak istiyorum.

<b>Hastanın Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Hastanın imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Tanık: Hasta yakını veya vasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 yaş altı hastalar için: Anne/Baba/Yakını</li><li>• Okur-yazar olmayan/görme özürlü hastalar için sözlü bilgilendirmeye ahitlik eden</li><li>• Yabancı dil nedeniyle çevirmen /tercüman</li></ul>	<b>Anne [ ] Baba [ ] Diğer [ ]</b> <b>Adı Soyadı:</b> <b>Adres:</b> <b>Tel:</b> <b>imzası:</b>	<b>Tarih:</b>
<b>Doktorun Adı Soyadı:</b>  <b>Adres:</b>  <b>Tel:</b>	<b>Doktorun imzası:</b>	<b>Tarih:</b>

**Kaynaklar:**

1. **Ankara Romatoloji Grubu: (Alfabetik sıra ile)** Ankara Ü. İmmünoloji-Romatoloji, Bakırkent Ü. Romatoloji, GATA Romatoloji, Gazi Ü. Romatoloji, Hacettepe Ü. Romatoloji, SB Ankara Dışkapı Nispetiye Hastanesi İmmünoloji-Romatoloji, SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji.
2. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)